Raboso piave

Vass7R05s321-325

Collection Vassal-Montpellier

1266Mtp2

TRahato Triane

Raboso piave Cl7 R5,321-325

Waster # 4000年在1920年











N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Raboso piave 7 R 5 s. 321-325 (s.4)

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

5lanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzée ou cuivré 197 - vert 198.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouftjere - autres.

Pace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - antièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, La couleur de la 28me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

# Tace inférieure

Tervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 262 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duvateux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauvo ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A péticle glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calus 88

Nº d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Raboso piave 7R5s-321-325f 6R3s-126,130 s.1

alaataa laamaalaadaa laataa l

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 264) - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre colore 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 26 vert 265.

#### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Ealvo 92

dantanlantanlantanlantanl

Nº d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Raboso piane 7 RS 1-321-325 6 FEUILLE ADULTE 6 R30.126.130.1-4

Petite 141 - moyenne (42) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 1(17) - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154) - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossiërement bullée 159) - gauffrée 160 -

plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176) - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 94

# Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année 4999 Observateur Code clone Code cepage liave Nom cépage : Kaboso Emplacement 7 RS \$ 321-325 6 R3 126-130 gue graffillors 99 oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9 oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7 oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 oiv 209\* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4 Baie ony 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3. oiv 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoïde 6 ylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. ouv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 ony 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. av 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. oiv 229 ombilic peu apparent 1 - apparent 2. ojy 230\* coloration de la pulpe : non coloree 1 - coloree 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (65-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbace 4 - goût spécial 5 oiy 236\* saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4nim) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9 oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

oiy 241 présence de pépins absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs), très faible (> 10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes 1 - présentes 2

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9

# Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles) Observateur Année 1999 Code clone 02 Code cepage Emplacement 6 R3 A126, 130 7 R5 A321-325 Nom cepage Kaboso piave Sarment oiv 101 section transversale : circulaire elliptique 3 - aplatie 5 oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3) oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtie 2) rouge violacé 3 - gris 4 oiv 104 lenticelles absentes 1) présentes 9 oiv 105 densité des poils dressés des nocuds : absence 1)- présence 9 oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence 1) présence 9 orv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit ( 5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm) 5 grand (14mm) 7 - tres grand (~17mm) 9 Porte-greffe oiv 551 rendement en bois/ha : tres faible 1 - faible/3 - moyen 5 - élevé / tres élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - ele e 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve très élevé 9

Vass.d

Noends aplates 1 moyen ? - saillants 3

Vigueur 3-4 pruine 3

```
Désignation: Raboso piave
Emplacement: (27 R5 à 321-325
```

```
: 1 - (2) - 3
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                   : 7 - (8) - 9
Li/L
                                   : 10 - (11)
                                   : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                 : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                   : (21) - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                   : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   :(267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
                                    :(271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : (40) - 41
Dents : forme
                                    : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
                                    : 45 - 46 - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
                                  : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                    : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

idiration from the disease of the first and the disease of the

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

PR. MARSAL 95